

Interpersoonlijke psychotherapie in een groep (444)

(Diagnostiek en werkwijze)

Bij interpersoonlijke psychotherapie in een groep (IPT-G) worden de vier focussen van de interpersoonlijke psychotherapie toegepast in een ambulante kortdurende groepstherapie (Wilfley e.a., 2000). Het betreft een vorm van korte termijn groepspsychotherapie. Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een evidence based behandelmethode, die voor het eerst werd toegepast voor de behandeling van depressie (Klerman, 1984). Uit onderzoek blijkt dat IPT ook effectief is bij de behandeling van andere psychiatrische ziektebeelden en doelgroepen, zoals de eetbuistoornis (Wilfley e.a., 2002) en bij adolescenten (Mufson e.a., 1993). In Nederland wordt interpersoonlijke psychotherapie aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van depressie en voor de behandeling van de eetbuistoornis (www.ggzrichtlijnen.nl).

Docenten:

Dhr. drs. M.F. van Vreeswijk; Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog BIG en is werkzaam als mededirecteur van G-kracht psychomedisch centrum en voorzitter van de stichting Groeikracht.

Mw. drs. D. Snippe; Dina Snippe werkt als psychotherapeute bij GGZ Delfland. Dina Snippe is opleider, supervisor en lid van de opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie en opleider, supervisor en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie.

Doelgroep:

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, 1^e lijnspsychologen, (GZ-) psychologen, SPV-en en psychiaters:

- die werkzaam zijn met behandelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg.
- die basiservaring hebben in het werken met interpersoonlijke psychotherapie

Doelstelling:

De deelnemers leren de vier IPT focussen toe te passen in een korte termijn groepspsychotherapie.

Inhoud:

- diagnostiek; indicatiestelling en de voorbereidende gesprekken voor de start van de IPT-G;
- de werkwijze van de IPT-G;
- het gebruik maken van de diverse technieken bij de focussen: rouw; rolverandering; interpersoonlijk conflict en interpersoonlijke sensitiviteit;
- de ontwikkelingsfasen in een korte-termijn groepspsychotherapie;

- het vasthouden van de focus in een groepsdynamische groep;
- specifieke methodieken in deze vorm van groepstherapie;
- aandacht voor de rol van de therapeut en de co-therapeutische relatie;
- het terugkoppelen van de resultaten van de vragenlijsten in de groep;
- IPT-G en onderzoek: de laatste stand van zaken en lopend onderzoek;
- informatie over nieuwe toepassingen van IPT-G.

Werkwijze:

Een belangrijk onderdeel van deze vorm van psychotherapie is het werken met een focus. Er zijn vier verschillende focussen: rouw; interpersoonlijk conflict; rolverandering en interpersoonlijke sensitiviteit. Voor de start van de groepstherapie wordt de focus in drie individuele voorbereidende gesprekken vastgesteld. De groepstherapie is de eerste drie zittingen semi-gestructureerd. Door middel van een kennismakingsoefening, psycho-educatie en het gebruiken van een sociogram wordt de cohesie in de beginfase van de groep bevorderd. Daarna wordt er uitsluitend groepsdynamisch gewerkt.

literatuur

Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Wilfley, D.E., MacKenzie, K.R., Welch, R.R., Ayres, V.E., & Weissman, M.M. (2000). Interpersonal Psychotherapy for Group, New York: Basic Books.

NVGP-erkenning

De cursus is erkend door de Nederlandse vereniging voor Groepspsychotherapie en Groepsdynamica met 18 punten als module van de postmaster opleiding tot groepstherapeut-NVGP: route NVGP De cursus is eveneens erkend t.b.v. groepswerkers NVGP met 18 uren modulaire cursus