

## Toets Tracheostomale Zorg en Chronisch Tracheostomale Beademing Kind

---

### De luchtwegen

- |   |      |       |             |
|---|------|-------|-------------|
| 1. Diep doorzuchten kan voorkomen dat slijm zich onder in de longen ophoopt                             | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 2. De stembanden liggen tussen de longen en het tracheostoma  | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 3. Tijdens de ademhaling wordt lucht in de longen ververst  | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 4. Gevolg van tekortschietende ademhaling kan zijn dat er slijm in de longen achterblijft               | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 5. Gevolg van een tekortschietende ademhaling kan zijn dat er teveel koolzuur in het bloed achterblijft | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

### Tracheostomale zorg

#### *Algemeen*

- |  |      |       |             |
|--|------|-------|-------------|
| 6. Het verwisselen van het splitgaas of metalline gaas behoort tot de dagelijkse verzorging van het tracheostoma                                 | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 7. Iemand met een tracheacanule moet altijd een reservecanule bij zich hebben  | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 8. Iemand met een tracheacanule heeft aanhoudende pijn. in de luchtpijp Deze klacht gaat vanzelf weer over, dus melden bij het CTB is overbodig. | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 9. Iemand met een tracheacanule moet altijd een ambuballon bij zich hebben   | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

#### **Canules**

*Vraag 10 en 11 alleen beantwoorden als er een Bivona of Portex of Shiley gebruikt wordt*

- |   |      |       |             |
|---|------|-------|-------------|
| 10. De canule moet een keer per week worden gewisseld                                   | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 11. Bij het verwisselen van de buitencanule moet gebruik gemaakt worden van een voerder | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

***Vraag 12, 13 en 14 alleen beantwoorden als er een Tracoe gebruikt wordt***

12. De buitencanule moet een keer per twee maanden verwisseld worden  ja  nee  weet niet
13. De binnencanule moet eenmaal per twee dagen verwisseld worden  ja  nee  weet niet
14. Bij het verwisselen van de buitencanule moet gebruik gemaakt worden van een voerder  ja  nee  weet niet

***Vraag 15, 16, 17 alleen beantwoorden als er een canule met cuff gebruikt wordt***

15. Als de cuff is opgeblazen kan er gesproken worden  ja  nee  weet niet
16. Als de cuff is opgeblazen kan er een vinger op de canule geplaatst worden zonder benauwd te worden  ja  nee  weet niet
17. Als de cuff leeggezogen wordt kan er slijm/speeksel langs de canule naar de longen zakken  ja  nee  weet niet

**Uitzuigen**

18. De beademingsmachine moet eerst een alarm geven voordat er uitgezogen mag worden  ja  nee  weet niet
19. Sputumpluggen kunnen zich binnen enkele minuten vormen  ja  nee  weet niet
20. Ook buiten het ziekenhuis moeten er handschoenen tijdens het uitzuigen worden gedragen  ja  nee  weet niet
21. Als er weerstand gevoeld wordt bij het inbrengen van de zuigslang mag deze verder geduwd worden  ja  nee  weet niet
22. Het druppelen met een steriele zoutoplossing (nacl 0,9%) in de canule zorgt ervoor dat slijm beter wordt opgehoest  ja  nee  weet niet
23. De luchtwegen moeten standaard tweemaal per dag moet worden uitgezogen  ja  nee  weet niet

**Beademingsmachines**

24. De beademingsmachine moet worden uitgezet tijdens het uitzuigen  ja  nee  weet niet

- |   |      |       |             |
|---|------|-------|-------------|
| 25. Als de beademings slang losschiet van de canule geeft de beademingsmachine een hoge druk alarm            | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 26. Bij een hoge druk alarm kan er sprake zijn van een sputumplug in de canule                                | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 27. Het is nodig om dagelijks zowel het lage als hoge druk alarm van de beademingsmachine te controleren.     | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 28. Een lage druk alarm kan veroorzaakt worden door een sputumplug in de canule                               | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 29. Een maxi Vt alarm (Elisee) kan betekenen dat de beademings slang van de beademingsmachine is losgeschoten | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 30. Bij een mini Vt alarm (Elisee) krijgt het kind te veel lucht  | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

**Eerste hulp**

- |   |      |       |             |
|---|------|-------|-------------|
| 31. Als de canule er per ongeluk uitvalt moet het CTB direct gebeld worden  | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 32. Als de patiënt aan de beademing benauwd is, moet de patiënt afgekoppeld worden van de machine en moet er uitgezogen worden en/of met een ambuballon verder beademd worden | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 33. Bij benauwdheid moet er als eerste gecontroleerd worden of de canule doorgankelijk is   | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 34. Als een stroomstoring langer dan 6 uur duurt moet dit worden gemeld bij het CTB   | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 33 Als een canule er dreigt uit te vallen en de cuff is leeg, of als het een canule zonder cuff is, mag deze teruggeduwd worden   | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |