

Toets Tracheostomale Zorg en Chronische Beademing Kind

- Naam:
- Zorginstelling:
- Datum:

De luchtwegen

- | | | | |
|---|------|-------|-------------|
| 1. Diep doorzuchten kan voorkomen dat slijm zich onder in de longen ophoopt | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 2. De stembanden liggen tussen de longen en het tracheostoma | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 3. Tijdens de ademhaling wordt lucht in de longen ververst | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 4. Gevolg van tekortschietende ademhaling kan zijn dat er slijm in de longen achterblijft | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 5. Gevolg van een tekortschietende ademhaling kan zijn dat er teveel koolzuur in het bloed achterblijft | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

Tracheostomale zorg

Algemeen

- | | | | |
|--|------|-------|-------------|
| 6. Het verwisselen van het splitgaas of metalline gaas behoort tot de dagelijkse verzorging van het tracheostoma | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 7. Iemand met een tracheacanule moet altijd een reservecanule bij zich hebben | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 8. Iemand met een tracheacanule heeft aanhoudende pijn. in de luchtpijp Deze klacht gaat vanzelf weer over, dus melden bij het CTB is overbodig. | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |
| 9. Iemand met een tracheacanule moet altijd een ambuballon bij zich hebben | 0 ja | 0 nee | 0 weet niet |

Canules

Vraag 10 en 11 alleen beantwoorden als er een Bivona of Portex of Shiley gebruikt wordt

10. De canule moet een keer per week worden gewisseld 0 ja 0 nee 0 weet niet
11. Bij het verwisselen van de buitencanule moet gebruik gemaakt worden van een voerder 0 ja 0 nee 0 weet niet

Vraag 12, 13 en 14 alleen beantwoorden als er een Tracoe gebruikt wordt

12. De buitencanule moet een keer per twee maanden verwisseld worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
13. De binnencanule moet eenmaal per twee dagen verwisseld worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
14. Bij het verwisselen van de buitencanule moet gebruik gemaakt worden van een voerder 0 ja 0 nee 0 weet niet

Vraag 15, 16, 17 alleen beantwoorden als er een canule met cuff gebruikt wordt

15. Als de cuff is opgeblazen kan er gesproken worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
16. Als de cuff is opgeblazen kan er een vinger op de canule geplaatst worden zonder benauwd te worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
17. Als de cuff leeggezogen wordt kan er slijm/speeksel langs de canule naar de longen zakken 0 ja 0 nee 0 weet niet

Uitzuigen

18. De beademingsmachine moet eerst een alarm geven voordat er uitgezogen mag worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
19. Sputumpluggen kunnen zich binnen enkele minuten vormen 0 ja 0 nee 0 weet niet
20. Ook buiten het ziekenhuis moeten er handschoenen tijdens het uitzuigen worden gedragen 0 ja 0 nee 0 weet niet
21. Als er weerstand gevoeld wordt bij het inbrengen van de zuigslang mag deze verder geduwd worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
22. Het druppelen met een steriele zoutoplossing (nacl 0,9 %) in de canule zorgt ervoor dat slijm beter wordt opgehoest 0 ja 0 nee 0 weet niet
23. De luchtwegen moeten standaard tweemaal per dag moet worden uitgezogen 0 ja 0 nee 0 weet niet

Beademingsmachines

24. De beademingsmachine moet worden uitgezet tijdens het uitzuigen 0 ja 0 nee 0 weet niet
25. Als de beademingsslang losschiet van de canule geeft de beademingsmachine een hoge druk alarm 0 ja 0 nee 0 weet niet
26. Bij een hoge druk alarm kan er sprake zijn van een sputumplug in de canule 0 ja 0 nee 0 weet niet
27. Het is nodig om dagelijks zowel het lage als hoge druk alarm van de beademingsmachine te controleren. 0 ja 0 nee 0 weet niet
28. Een lage druk alarm kan veroorzaakt worden door een sputumplug in de canule 0 ja 0 nee 0 weet niet

Eerste hulp

29. Als de canule er per ongeluk uitvalt moet het CTB direct gebeld worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
30. Als de patiënt aan de beademing benauwd is, moet de patiënt afgekoppeld worden van de machine en moet er uitgezogen worden en/of met een ambuballon verder beademend worden 0 ja 0 nee 0 weet niet
31. Bij benauwdheid moet er als eerste gecontroleerd worden of de canule doorgankelijk is 0 ja 0 nee 0 weet niet
32. Als een stroomstoring langer dan 6 uur duurt moet dit worden gemeld bij het CTB 0 ja 0 nee 0 weet niet
33. Als een canule er dreigt uit te vallen en de cuff is leeg, of als het een canule zonder cuff is, mag deze teruggeduwd worden 0 ja 0 nee 0 weet niet