

Programma *Psyfar*- Editie 3, 2019

Module 1: Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie

1. Inleiding
2. Behandeling van psychotisch gedrag
3. Behandeling van depressief gedrag
4. Behandeling van angstig gedrag
5. Behandeling van geagiteerd gedrag
6. Submodule: nachtelijke onrust
7. Behandeling van apathisch gedrag
8. Beschouwing en conclusie

Over de auteurs

T.H. van Zonneveld, psychiater Antes, onderdeel van Parnassia Groep Rotterdam. Belangenconflict: geen

A.V.A. Verkuil, psychiater Antes, onderdeel van Parnassia Groep Rotterdam

R.M. Kok, psychiater en epidemioloog, Parnassia Groep Den Haag

Samenvatting

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, heeft in 2018 de vernieuwde richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie uitgebracht. De nadruk ligt op onderzoeken waar het gedrag uit bestaat, voor wie het een probleem is, welke factoren eraan ten grondslag kunnen liggen en wat de onderhoudende factoren zijn. Het doel is te komen tot een multidisciplinaire probleemanalyse en een methodische werkwijze, ongeacht de verblijfplaats. De effectiviteit van psychofarmaca in de behandeling van probleemgedrag is beperkt en voordat overwogen wordt deze voor te schrijven moeten behandelbare somatische oorzaken zijn geëvalueerd. In dit artikel vatten wij de richtlijn samen, waarbij we vanwege de aard van dit tijdschrift psychofarmaca uitgebreider bespreken dan andere interventies.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

- bent u op de hoogte van de inclusiecriteria en hoe de bewijskracht van deze richtlijn tot stand is gekomen en kent u ook de beperkingen ervan
- bent u bekend met de algemene principes voor de diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie
- bent u op de hoogte van de effectiviteit van de niet-farmacologische interventies en van psychofarmaca bij de vijf veelvoorkomende gedragscategorieën van probleemgedrag bij mensen met dementie