

LET OP !!!

© 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen mogen echter niet voor andere doeleinden worden gebruikt voordat schriftelijke toestemming van de NRR is verkregen.



Basale reanimatie van baby's en kinderen

Versie sep. 2016



Nederlandse Reanimatie Raad





LEERDOELEN


Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:

- Hoe u een bewusteloos kind benadert.
- Hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert.
- Hoe u een automatische externe defibrillator gebruikt.
- Hoe u een bewusteloos kind dat ademt in stabiele zijligging plaatst.
- Hoe u een kind dat zich verslikt of dreigt te stikken helpt.

ACHTERGRONDINFORMATIE

- Bij baby's en kinderen is een ademhalingsprobleem de meest voorkomende oorzaak van een circulatiestilstand.
- De richtlijnen voor reanimatie van kinderen geldt voor alle kinderen tot de puberteit.
- De richtlijnen zijn niet bedoeld voor de "natte" pasgeborenen.

KETEN VAN OVERLEVING









Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

Geef 5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

**15 borstcompressies
2 beademingen**

Ga door 15:2

**Activeer AED,
zodra deze er is**

LET OP VEILIGHEID



CONTROLEER BEWUSTZIJN



Schud voorzichtig aan de schouders.

Vraag: "Gaait het?"

Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen


Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

(LAAT) 112 BELLEN (+ AED)



- Leg telefoon naast slachtoffer (op speakerfunctie).
- Laat een AED halen indien beschikbaar.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen


Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

(~~LAAT~~) 112 BELLEN (+ AED)



- Leg telefoon naast slachtoffer (op speakerfunctie).
- Volg de instructies van de centralist.
- Haal een AED indien direct beschikbaar.



***Alleen en geen telefoon binnen handbereik:
Na 1 minuut: bel 112 en haal een AED indien direct beschikbaar.***

Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

OPEN LUCHTWEG EN CONTROLEER ADEMHALING



Kijk, luister en voel naar
NORMALE ademhaling.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen


Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen


Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

OPEN LUCHTWEG EN CONTROLEER ADEMHALING



Kijk, luister en voel naar
NORMALE ademhaling.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is



VRAGEN?

Oefenen vaardigheden

GEEF 5 BEADEMINGEN

- Hoofd in neutrale positie.
- Plaats lippen rond de mond en neus.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen


Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

GEEF 5 BEADEMINGEN



- Kantel het hoofd voorzichtig.
- Plaats lippen rond de mond. Knijp de neus dicht.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

Als het kind wel reageert


- Leg het kind in stabiele zijligging.



Als het kind niet reageert

Als het kind niet:

- wakker wordt,
- beweegt,
- ogen open,
- normaal ademt.



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen


Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

15 BORSTCOMPRESSIES EN 2 BEADEMINGEN



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

**15 borstcompressies
2 beademingen**

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

15 BORSTCOMPRESSIES EN 2 BEADEMINGEN



Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

**15 borstcompressies
2 beademingen**

Ga door 15:2


Activeer AED,
zodra deze er is

GA DOOR MET REANIMEREN 15:2

15



2



**Indien mogelijk:
wissel om de 2 minuten van hulpverlener.**

Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is




VRAGEN?

Oefenen vaardigheden





GEBRUIK VAN DE AED



© NRR

Geef altijd eerst 5 initiële beademingen voordat u een AED aansluit.

Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

5 initiële beademingen


Als het kind niet reageert

15 borstcompressies
2 beademingen

Ga door 15:2

Activeer AED,
zodra deze er is

ZET DE AED AAN



- Sommige AED's gaan automatisch aan als u de deksel opent.
- Bij anderen moet u een “aan”-knop indrukken.
- Er zijn AED's met en zonder schok-knop.

© NRR

VOLG AED-INSTRUCTIES



- Gebruik liefst kinderelektroden voor kinderen onder de 8 jaar.
- Anders elektroden voor volwassenen gebruiken.
- Eenmaal bevestigde elektroden niet meer loshalen.




Elektroden voor volwassenen voor-achter plakken.



VOLG AED-INSTRUCTIES






Aanvullende vaardigheden

STABIELE ZIJLIGGING

Wanneer het kind (weer) normaal ademt,
leg in stabiele zijligging.




**Laat eventuele
elektroden zitten!**

STABIELE ZIJLIGGING




VERSTIKKING / VERSLIKKING





Aanvullende informatie

MELDKAMERINSTRUCTIE ALS ONDERDEEL VAN REANIMATIE



AANVULLENDE INFORMATIE

- Reanimatie Oproep Netwerken



Aanmelden via www.hartstichting.nl/reanimatie

AANVULLENDE INFORMATIE

- Hulpmiddelen
- Opfrustrainingen



VRAGEN ?

JULLIE MAKEN HET VERSCHIL

Kind reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

Geef 5 initiële beademingen

Als het kind niet reageert

**15 borstcompressies
2 beademingen**

Ga door 15:2

**Activeer AED,
zodra deze er is**



Bedankt voor
uw aandacht